


# INSTRUÇÕES DE USO

**EMGALITY®**

**(galcanezumabe)**

Injeção para uso por via subcutânea  
Seringa pré-preenchida



**Antes de usar a seringa pré-preenchida de EMGALITY, leia e siga cuidadosamente todas as instruções passo-a-passo.**


## **Informações importantes:**

- Seu médico deve mostrar a você como preparar e injetar EMGALITY usando a seringa pré-preenchida. Não aplique a injeção em si mesmo ou em outra pessoa até que tenha sido demonstrado a você como EMGALITY deve ser aplicado.
- Guarde estas instruções de uso e consulte-as quando necessário.
- Cada seringa pré-preenchida de EMGALITY **deve ser usada apenas uma vez**. Não compartilhe nem reutilize sua seringa pré-preenchida de EMGALITY. Você pode transmitir ou contrair uma infecção.
- Seu médico pode ajudá-lo a decidir o local do seu corpo para aplicar a dose. Você também pode ler neste manual a seção "**Escolha seu local de aplicação**", para ajudá-lo a escolher qual área pode ser melhor para você.
- Se você tem problema de visão, **não** use a seringa pré-preenchida de EMGALITY sem a ajuda de um cuidador.

# INSTRUÇÕES DE USO

Antes de usar a seringa pré-preenchida de EMGALITY, leia e siga cuidadosamente todas as instruções.

## Partes da seringa pré-preenchida de EMGALITY



## Antes de começar

Retire a seringa pré-preenchida da geladeira

Retire 3 seringas pré-preenchidas de EMGALITY da geladeira.

**Não remova a tampa da agulha até que você esteja pronto para aplicar a injeção.**

**Não** agite.

**Não** levar a seringa pré-preenchida ao micro-ondas, não colocar água quente sobre ela ou deixá-la sob a luz solar direta.

Para uma injeção mais confortável, deixe a seringa pré-preenchida à temperatura ambiente por 30 minutos antes de aplicar.


## Examine a seringa pré-preenchida e o medicamento

Certifique-se de que você está com o medicamento correto. O medicamento dentro da seringa deve ser claro. Sua cor pode ser incolor a levemente amarela.

**Não** utilize a seringa pré-preenchida e descarte-a conforme orientado pelo seu médico ou farmacêutico se:

- ela parecer danificada
- o medicamento estiver turvo, descolorido ou apresentar pequenas partículas
- a data de validade impressa no rótulo já tiver passado
- o medicamento estiver congelado


### Data de validade



## Prepare-se para a aplicação

Lave as mãos com água e sabão antes de injetar EMGALITY. Certifique-se de que haja por perto um recipiente para descarte de materiais perfurocortantes.

## Escolha o local de aplicação




Seu médico pode ajudá-lo a escolher o melhor local de aplicação para você.

- **Você** pode aplicar EMGALITY na região do estômago (abdome) ou na coxa. Não aplique a menos de 5 cm do umbigo.
- **Outra pessoa** pode aplicar a injeção na parte de trás do seu braço ou nas nádegas.
- **Não** aplique sempre no mesmo lugar. Por exemplo, se a primeira injeção foi no abdome, a próxima injeção pode ser em outra área do abdome.
- **Limpe e seque o local de aplicação antes de injetar.**


## 1 Destampe

- **Não remova a tampa da agulha até que esteja pronto para aplicar a injeção.**
- Remova a tampa da agulha e jogue-a no lixo comum.
- **Não** coloque a tampa da agulha de volta - você pode danificar a agulha ou espetar-se por acidente.
- **Não** toque na agulha.




## 2 Insira

- Aperte e segure levemente uma prega da pele onde você vai injetar.
- Insira a agulha em um ângulo de 45 graus.




## 3 Injete

- Pressione lentamente o apoio do polegar a fim de empurrar o êmbolo totalmente, até injetar todo o medicamento.
- O êmbolo cinza da seringa deve ser empurrado totalmente até a extremidade da seringa.



- Você deve ver a haste coral do êmbolo através do corpo da seringa quando a injeção estiver completa, conforme mostrado.
- Retire a agulha da pele e solte a pele com cuidado.
- **Não** coloque a tampa da agulha de volta na seringa pré-preenchida.




Haste coral do êmbolo

Êmbolo cinza da seringa

## Após injetar o Medicamento

## Jogue fora a seringa pré-preenchida usada

- Logo após o uso, coloque a seringa pré-preenchida de EMGALITY em um recipiente para descarte de materiais perfurocortantes. **Não** jogue a seringa pré-preenchida de EMGALITY no lixo comum.



- Se você não tiver um recipiente para descarte de materiais perfurocortantes, você pode usar outro recipiente que seja:
  - feito de plástico resistente;
  - passível de ser fechado com uma tampa ajustável, resistente a perfurações, sem a possibilidade das agulhas saírem;
  - vertical e estável durante a utilização;
  - resistente a vazamentos; e
  - devidamente etiquetado para alertar sobre os resíduos perigosos que estão dentro do recipiente.
- Quando o recipiente para descarte de materiais perfurocortantes estiver quase cheio, você deve cumprir as orientações sobre o modo correto de descartá-lo. Para obter informações sobre como descartar corretamente o recipiente, pergunte ao seu médico sobre as opções disponíveis em sua região.
- **Não** recicle o recipiente de descarte de materiais perfurocortantes que já foi usado.

Para cada uma das 3 injeções, repita todas as instruções com uma nova seringa pré-preenchida.

## Perguntas Frequentes

### P. E se eu vir bolhas de ar na seringa pré-preenchida de EMGALITY?

R. É normal haver bolhas de ar na seringa pré-preenchida. EMGALITY é injetado sob a pele (injeção subcutânea).

### P. E se houver uma gota de líquido na ponta da agulha quando eu remover a tampa da agulha?

R. É normal ver uma gota de líquido na ponta da agulha.

### P. E se eu não conseguir empurrar o êmbolo?

R. Se o êmbolo estiver travado ou danificado:

- **Não** continue a usar a seringa
- Retire a agulha da sua pele
- Descarte a seringa e use uma nova.

### P. E se houver uma gota de líquido ou sangue em minha pele após a injeção?

R. Isso é normal. Pressione uma bola de algodão ou gaze sobre o local da injeção. Não fricção o local da injeção.

**P. Como posso saber se a injeção está completa?**

**R.** Quando sua injeção estiver completa:

- A haste coral do êmbolo deve estar visível através do corpo da seringa.
- O êmbolo cinza da seringa deve ser empurrado totalmente até a extremidade da seringa, próxima à agulha.

**Se você tiver mais perguntas sobre como usar a seringa pré-preenchida de EMGALITY:**

- Ligue para o seu médico
- Ligue para o Lilly SAC 0800 701 0444
- Acesse [www.lilly.com.br](http://www.lilly.com.br)

## **Armazenamento e Manuseio**

- Armazene a sua seringa pré-preenchida na geladeira, entre 2°C e 8°C.
- A sua seringa pré-preenchida pode ser armazenada sem refrigeração por até 7 dias. Não armazene acima de 30°C.
- Não congele a sua seringa pré-preenchida.
- Proteja a sua seringa pré-preenchida da luz até a sua utilização.
- Não agite a sua seringa pré-preenchida.
- Descarte a sua seringa pré-preenchida se qualquer condição acima não for cumprida.
- Mantenha a sua seringa pré-preenchida e todos os medicamentos fora do alcance das crianças.

**Leia na íntegra a bula para o paciente de EMGALITY dentro desta caixa para saber mais sobre o seu medicamento.**

**Fabricado por:**

ELI LILLY AND COMPANY – Indianápolis – EUA

**Importado por:**

ELI LILLY DO BRASIL LTDA.

Av. Morumbi, 8264 - São Paulo, SP - Brasil

CNPJ 43.940.618/0001-44

Registro MS - 1.1260.0200

Farm. Resp.: Márcia A. Preda – CRF-SP nº 19.189

EMGALITY é uma marca registrada da Eli Lilly and Company.

Copyright © 2019, Eli Lilly and Company. Todos os direitos reservados.

Lilly SAC 0800 701 0444

[sac\\_brasil@lilly.com](mailto:sac_brasil@lilly.com)

[www.lilly.com.br](http://www.lilly.com.br)



**Esta instrução de uso foi aprovada pela ANVISA em 06/01/2020.**